

فوریت آنی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۱۹:۵۰:۰۲

شماره داخلی ۵۳۵۷۲۹/۱۴۰۱

شماره ثبت صادره ۱۴۰۱/۰۹/۳۰۲/۳۰۵۰۶/ص

تاریخ ثبت صادره ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۰:۲۴:۲۴

پیوست ندارد



باسمه تعالی

معاونت غذا و دارو

روشن کردن پیک نیک در چادر مسافرتی و اتومبیل میتواند سریعاً باعث مرگ شود.

نام و سمت گیرنده

ردیف	نام و سمت گیرنده	کد	عملیات
۱	جناب آقای دکتر علی بهادر رئیس بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا		
۲	سرکار خانم دکتر لاله محمودی مدیر گروه داروسازی بالینی		
۳	جناب آقای دکتر غلامرضا دهقان زاده رئیس محترم انجمن دارو سازان فارس		
۴	کلیه روسای محترم بیمارستان های تابعه		

موضوع تداخل دارویی و تجویز همزمان دو داروی سولامر و مایکوفنولات بدون تعیین زمان مصرف داروهای مذکور

با سلام و احترام

به پیوست مکاتبه مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور در خصوص تداخل داروی مایکوفنولات با سولامر بصورت همزمان و عدم تعیین زمان مصرف داروها، جهت هرگونه بهره وری بحضورتان ارسال می گردد.

نام و سمت مدیر واحد

دکتر مهدی خسروی مدیر دارو و فرآورده های بیولوژیکی و مواد

اقدام کننده

مجید عسکری - کارشناس نظارت بردارو

تلفن ۷۴۷۹

کلید واژه

آدرس

پست الکترونیک dpt2297983034@sums.ac.ir



### معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی - لزوم توجه به تداخلات دارویی - تداخل داروی میکوفنولات با سولامر به صورت همزمان و عدم تعیین زمان مصرف داروها - معاونت های غذا و داروی سراسر کشور

با سلام؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع گزارشی مبنی بر وقوع اشتباه داروپزشکی، عدم توجه به تداخل دارویی و تجویز همزمان دو داروی سولامر و میکوفنولات بدون تعیین زمان مصرف داروهای مذکور به شرح زیر دریافت نموده است:

برای بیمار، بعد از عمل پیوند قلب دو داروی سولامر و میکوفنولات تجویز شده است و در دستورات دارویی به زمان مصرف دو دارو اشاره نشده است. داروساز بیمارستان پس از حضور بر بالین بیمار و چک کردن کاردکس دارویی متوجه تداخل داروی میکوفنولات و سولامر و عدم درج زمان مصرف داروهای مذکور شده که پس از مشاوره با پزشک معالج و تاکید بر عدم مصرف این دو دارو به صورت همزمان از ادامه مصرف این دو دارو به صورت همزمان جلوگیری شده است و پزشک دستور دارویی را در کاردکس درج نموده و به پرستاران آموزش های لازم را میدهد. طبق بررسی منابع علمی، داروی سولامر غلظت سرمی داروی میکوفنولات را ممکن است کاهش دهد و در رده D تداخلات قرار دارد. برای مدیریت این تداخل، داروی میکوفنولات باید حداقل دو ساعت قبل از داروی سولامر مصرف گردد. راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی مشابه شامل:

(۱) توجه به تداخلات دارویی در هنگام تجویز و تحویل دارو به بیماران و آموزش کافی به بیماران در این خصوص دارای اهمیت ویژه می باشد. لذا فراهم شدن امکان مشاوره بین پزشک معالج و داروساز در موارد وجود تداخلات دارویی در دستورات دارویی در بستر سامانه نسخه الکترونیک ضروری است.

(۲) پایش و مانیتورینگ دقیق و منظم علائم بالینی و آزمایشگاهی بیماران توسط پزشکان معالج، درخصوص موارد مرتبط با تغییر سطح خونی داروها به علت وجود تداخلات دارویی و آموزش بیماران درخصوص لزوم مراجعه منظم آنان مطابق برنامه مشخص به پزشک معالج

(۳) درج دقیق دستورات دارویی و زمان مصرف داروها به صورت خوانا در پرونده و کاردکس دارویی و آموزش پرستاران در خصوص رعایت دقیق زمان اجرای دستورات دارویی

خواهشمند است، دستور فرمائید، مراتب به همه مراکز دارویی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش آن معاونت محترم، اطلاع رسانی شود.

دکتر نوشین محمدحسینی

مدیر کل دفتر نظارت و پایش

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان خواجه نصیر، پلاک ۳۰

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰  
رونوشت: شماره: ۶۶۴۰۵۵۷۱  
کد پستی: ۳۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نیش خیابان، خارک، پلاک ۲۹، تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰  
جناب آقای دکتر شهرام عفری مدیر کل محترم درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی  
نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

جناب آقای دکتر سلیمان حیدری سپرست محترم مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

سرکار خانم مهندس حسینی اشپلا رئیس اداره اسناد و مکاتبات اداری